

## **Mode d'emploi du médicament STREFEN**

### **Dans quel cas le médicament STREFEN est-il prescrit ?**

Ce médicament d'usage local contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte contre l'inflammation et la douleur.

Il est utilisé pour soulager les maux de gorge.

### **Présentations du médicament STREFEN**

**STREFEN** : pastille (arôme citron) ; boîte de 16

### **Composition du médicament STREFEN**

p past

Flurbiprofène 8,75 mg

Sucres 2,5 g

Substance active : Flurbiprofène

Excipients : Alpha-tocophérol, Butylhydroxyanisole, Citron arôme, Citron essence, Glucose, Lévométhol, Macrogol 300, Miel, Potassium hydroxyde, Saccharose solution, Sucre, Terpènes

### **Contre-indications du médicament STREFEN**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie ou d'asthme provoqué par la prise d'AINS, y compris l'aspirine ;
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ;
- insuffisance hépatique grave ;
- insuffisance rénale grave ;
- enfant de moins de 12 ans ;
- **grossesse** (à partir du 6<sup>e</sup> mois).

#### **Attention**

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours, de douleur en avalant ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une pharyngite et une angine. En cas d'angine bactérienne, un traitement antibiotique est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.

Bien que ce médicament soit en vente libre, ne l'utilisez pas sans avis médical dans les cas suivants : hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, rhinite ou sinusite chronique, d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou de risque hémorragique digestif (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique).

Certaines situations doivent conduire à ne poursuivre le traitement qu'après un avis médical :

- brûlures d'estomac importantes ou selles noires et nauséabondes pouvant traduire une irritation ou un saignement du tube digestif ;
- éruption cutanée, crise d'asthme ;
- fatigue inhabituelle et intense, ou baisse brutale et importante du volume des urines chez une personne souffrant d'insuffisance cardiaque, déshydratée ou traitée par diurétique.

Ce médicament contient du sucre (saccharose) en quantité notable.

Conducteur : ce médicament peut provoquer parfois des étourdissements et des troubles de la vue.

### **Interactions du médicament STREFEN avec d'autres substances**

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, notamment :

- l'aspirine et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : risque d'augmentation des effets indésirables ;
- les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires (**PLAVIX...**) : augmentation du risque hémorragique ;
- le lithium (**TÉRALITHE**) : augmentation du taux de lithium dans le sang ;

- le méthotrexate.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien en cas de traitement par un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un inhibiteur de l'angiotensine II, un bêtabloquant ou un médicament contenant de la ciclosporine.

### Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse : Des effets néfastes pour l'enfant à naître ont été mis en évidence lorsque les AINS sont utilisés au cours des 4 derniers mois de la grossesse ; le risque existe même avec une seule prise et même si la grossesse est à terme. L'usage de ce médicament est contre-indiqué pendant cette période.

Pendant les 5 premiers mois, l'effet de ce médicament est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :

Les AINS passent dans le lait maternel ; ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

### Mode d'emploi et posologie du médicament STREFEN

Les pastilles doivent être sucées sans être croquées. Les prises doivent être espacées de 3 à 6 heures.

Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 pastille, 1 à 5 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 3 jours sans avis médical.

### Conseils

Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

### Effets indésirables possibles du médicament STREFEN

Picotements ou goût métallique dans la bouche. Nausées, vomissements, gastrite.

Rarement :

- ulcère de l'estomac ou du duodénum, hémorragie du tube digestif (vomissements sanglants, selles noires, ou le plus souvent pertes de sang imperceptibles, responsables de l'apparition progressive d'une anémie) le plus souvent lors d'un traitement de longue durée ou à forte dose ;
- réaction allergique : éruption cutanée, démangeaisons, œdème, crise d'asthme, malaise avec chute brutale de la tension artérielle ;
- vertiges, maux de tête exceptionnels ;
- troubles de la vision nécessitant un examen ophtalmologique ;
- anomalie de la numération formule sanguine, augmentation des transaminases.

**Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.**



Pharmacie Paget  
2 rue Pasteur  
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02  
Fax 05.63.38.96.10

pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

**Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.**